



OSPEDALE SENZA DOLORE

PROTOCOLLO TERAPIA ANTALGICA



REPARTO OSTETRICIA

U.O.C. Ostetricia – Ginecologia: Direttore: Prof. Felice Petraglia

POST OPERATORIO: fino a 72 ore;

Imposta la terapia antalgica: anestesista
Gestione terapia antalgica: anestesista: in orario 08 – 20 ginecologo: in orario 20 - 08

POST PARTOANALGESIA: fino a 12 ore

ALTRE SITUAZIONI CLINICHE ALGOGENE

Imposta la terapia antalgica: medico di reparto
Gestione terapia antalgica: medico di reparto

Collaboratori: Dr. P. Bianciardi
Dr.ssa A. Croci
Dr.ssa L. Pecciarini

IMPORTANTE


- ☑ La terapia antalgica di base è scritta e registrata nella scheda di terapia
- ☑ La rescue dose è scritta e registrata nella scheda di monitoraggio clinico e del dolore

NB: I nomi dei farmaci (nel rettangolo verde) sono quelli che attualmente sono forniti dalla farmacia dell'ospedale.

	Terapia antalgica			Rescue dose
	bolo iniziale	1° – 2° giorno	giorni successivi	
malattia				
<input checked="" type="checkbox"/> flebiti, tromboflebiti, varico-flebite superficiali degli arti inferiori e superiori	<p>Somministrato in base a VALUTAZIONE MEDICA</p> <p>Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 100 in 30'</p>	<p>Perfalgan 1 flac ev in 15' x 4</p> <p>oppure</p> <p>Tachipirina 1000 1 cp / os x 4</p>	<p>Tachipirina 1000 1 cp / os x 4</p> <p>oppure</p>	<p>Per la prescrizione VEDERE CHIARIMENTI</p> <p>Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 100 in 30'</p> <p>oppure</p> <p>1 fl / im</p> <p>oppure</p> <p>1 cp / os</p>
intervento chirurgico parto				
<input checked="" type="checkbox"/> parto eutocico * Parto eutocico in analgesia: gestione dell'anestesista per 12 ore	<p>oppure</p> <p>Perfalgan 1 flac ev in 15'</p> <p>oppure</p> <p>Contramal 1 fl / S. F. 100 in 30'</p>	<p>oppure</p> <p>Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 250 in 8 h x 3</p> <p>oppure</p> <p>1 fl / S. F. 100 in 30' x 3</p> <p>oppure</p> <p>1 fl / im x 3</p> <p>oppure</p> <p>1 cp / os x 3</p> <p>oppure</p> <p>Contramal 1 fl / S. F. 250 in 6 h x 4</p> <p>oppure</p> <p>1 fl / S. F. 100 in 30' x 4</p> <p>oppure</p> <p>1 fl / im x 4</p> <p>oppure</p> <p>20 gtt / os x 4</p> <p>oppure</p> <p>1 cp / os x 4</p> <p>crioterapia locale (borsa di ghiaccio, a permanenza, nella sede dell'intervento)</p>	<p>oppure</p> <p>Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 100 in 30' x 3</p> <p>oppure</p> <p>1 fl / im x 3</p> <p>oppure</p> <p>1 cp / os x 3</p> <p>oppure</p> <p>Contramal 1 fl / S. F. 100 in 30' x 4</p> <p>oppure</p> <p>1 fl / im x 4</p> <p>oppure</p> <p>20 gtt / os x 4</p> <p>oppure</p> <p>1 cp / os x 4</p>	<p>oppure</p> <p>Contramal 1 fl / S. F. 100 in 30'</p> <p>oppure</p> <p>1 fl / im</p> <p>oppure</p> <p>20 gtt / os</p> <p>oppure</p> <p>1 cp / os</p> <p>oppure</p> <p>Perfalgan 1 flac ev in 15'</p> <p>oppure</p> <p>Tachipirina 1000 1 cp / os</p>

CHIARIMENTI

1. Il BOLO INIZIALE è somministrato in seguito a valutazione medica
2. Per la somministrazione della RESCUE DOSE ci si comporta come da schema seguente:



Terapia antalgica			Rescue dose
bolo iniziale	1° – 2° giorno	giorni successivi	

malattia

- sciatalgia
- lombosciatalgia
- lombaggine

E' CONSIGLIABILE LA CONSULENZA PRESSO LA TERAPIA ANTALGICA

- sindrome emorroidaria
- mastite, ascesso mammario

Contramal
1 fl / S. F. 100 in 30'

Perfalgan
1 flac ev in 15' x 4

Perfalgan
1 flac ev in 15' x 4
oppure
Tachipirina 1000
1 cp / os x 4

Contramal
1 fl / S. Fisiol. 100 in 30'
oppure
1 fl / im
oppure
20 gtt / os
oppure
1cp / os

intervento chirurgico parto vaginale

Contramal
1 fl / S. F. 100 in 30'
+
Perfalgan
1 flac ev in 15'

Contramal
1 fl / S. F. 250 in 6 h x 4
+
Perfalgan
1 flac ev in 15' x 4

Contramal
1 fl / S. F. 100 in 30' x 4
oppure
1 fl / im x 4
oppure
20 gtt / os x 4
oppure
1cp / os x 4

oppure
Toradol o Lixidol
1 fl / S. Fisiol. 100 in 30'
oppure
1 fl / im
oppure
1 cp / os

- parto eutocico
- * Parto eutocico in analgesia: gestione dell'anestesista per 12 ore**

Perfalgan
1 flac ev in 15'

Perfalgan
1 flac ev in 15'
+
Toradol o Lixidol
1 fl / S. F. 250 in 8 h x 3

Toradol o Lixidol
1 fl / S. F. 100 in 30' x 3
oppure
1 fl / im x 3
oppure
1 cp / os x 3

oppure
Perfalgan
1 flac ev in 15'
oppure
Tachipirina 1000
1 cp / os

- episiotomia
- lacerazioni vagino-perineali
- morsi uterini
- ingorgo mammario, ragadi del Capezzolo, ematoma genitale
- tamponamento endouterina
- applicazione forcipe
- secondamento strumentale, manuale

Toradol o Lixidol
1 fl
+
Contramal
1 fl

S. F. 100 in 30'

crioterapia locale
(borsa di ghiaccio, a permanenza, nella sede dell'intervento)

DOLORE LIVELLO C		- dolore grave -		VAS 7 - 10
	Terapia antalgica			Rescue dose
	bolo iniziale	1° - 3° / 4° giorno	giorni successivi	
malattia	GRAV. ≤ 36 Ws			
<input type="checkbox"/> colica renale VALUTARE L'OPPORTUNITA' CONSULENZA UROLOGICA	Toradol o Lixidol 2 fl / S. F. 250 in 60'	Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 250 in 8 h + Idratazione S.F. 750 ml S. Glucosata 5% 750 ml		Morfina 10 mg <u>1f im</u>
	GRAV. ≥ 37 Ws			
	Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 100 in 30' + Buscopan 1 fl / S. F. 100 in 30'	Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 250 in 8 h Buscopan 2 fl / S. F. 250 in 8 h + Idratazione in 24 h S.F. 750 ml S. Glucosata 5% 750 ml	oppure	Morfina 10 mg <u>1f im</u>

▣ colica biliare

**VALUTARE L'OPPORTUNITA'
CONSULENZA ECOGRAFICA**

Toradol o Lixidol
2 fl / S. F. 250 in 60'

Toradol o Lixidol
1 fl / S. F. 250 in 8 h x 3

Nexium
1 cp x 2

RACCOMANDAZIONE

NO MORFINA

Perfalgan
1 flac ev in 15'

+

Zofran
1fl / S. F. 250 in 3 h

+

Ranidil
2fl / S. F. 250 in 6 h

+

Digiuno per 6 h

poi

Dieta liquida

+

Ghiaccio ipocondrio destro

- flegmasia alba dolens e cerulea dolens
- flebiti, tromboflebiti, varico flebite profonde degli arti inferiori e superiori
- trombosi plesso emorroidario

Morfina 10 mg
1f S. F. 100 in 30'
+
Perfalgan
1 flac ev in 15'

oppure

Morfina 10 mg
1f
+
Lixidol o Toradol
1 fl

S. F. 100 in 30'

oppure

Temgesic
1 fl S. F. 100 in 30'
+
Perfalgan
1 flac ev in 15'

oppure

Temgesic
1f
+
Lixidol o Toradol
1 fl

in S. F. 100 in 30'

Temgesic
4 fl in 60 ml S.F.
siringa elastomerica 30 / h
(2 ml / h)

oppure

Morfina 10 mg
4 fl in 60 ml S.F.
siringa elastomerica 30 / h
(2 ml / h)

crioterapia locale
(borsa di ghiaccio, a permanenza, nella sede dell'intervento)

Perfalgan
1 flac ev in 15' x 4

Tachipirina 1000
1 cp / os x 4

oppure

Toradol o Lixidol
1 fl / S. F. 100 in 30' x 3

1 fl / im x 3

1 cp / os x 3

oppure

oppure

oppure

oppure

Contramal
1 fl / S. F. 100 in 30' x 4

1 fl / im x 4

20 gtt / os x 4

1cp / os x 4

oppure

oppure

oppure

Temgesic
1f S. F. 100 in 30'

oppure

Morfina 10 mg
1f S. F. 100 in 30'

oppure

Contramal
1 fl / S. Fisiol. 100 in 30'

1 fl / im

20 gtt / os

1cp / os

oppure

oppure

oppure

oppure

Toradol o Lixidol
1 fl / S. Fisiol. 100 in 30'

1 fl / im

1 cp / os

oppure

oppure

oppure

Perfalgan
1 flac ev in 15'


Tachipirina 1000
1 cp / os

oppure



**intervento chirurgico
parto vaginale**

- taglio cesareo
- isterectomia post parto
- diastasi sinfisi pubica
- coccigodinia
- complicanze post parto e post chirurgiche apparato urogenitale e gastroenterico

IL MANAGEMENT DEL DOLORE



MANAGEMENT TERAPIA ANTALGICA LIVELLO B - C



LEGENDA

* B = dolore livello B - forte -
 * C = dolore livello C - grave -

* TB = terapia antalgica di base
 * VAS = scala analogica visiva
 * Rd = rescue dose
 * pres.med. = prescrizione medica
 * som.inf. = somministrazione terapia dall'infermiere
 * inf. = infermiere

* VAS dopo 1 h = controllo VAS a distanza di 1 ora dall'inizio della somministrazione del farmaco