

OSPEDALE SENZA DOLORE

Coordinatori: A. Annesanti F. Tani

PROTOCOLLO TERAPIA ANTALGICA

REPARTO CHIRURGIA 3

Direttore: Prof. Sergio Mancini

POST OPERATORIO

Imposta la terapia antalgica: medico di reparto
Gestione terapia antalgica: medico di reparto

ALTRE SITUAZIONI CLINICHE ALGOGENE

Imposta la terapia antalgica: medico di reparto
Gestione terapia antalgica: medico di reparto

Collaboratori: Prof. Testi Walter
Dott. Giovanni Cappelli

LIVELLO A - dolore modesto - VAS 1 – 3


	Terapia antalgica			Rescue dose
	bolo iniziale	1° – 2° giorno	giorni successivi	
<p>malattia</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> flebiti, tromboflebiti, varico-flebiti superficiali degli arti inferiori e superiori <input type="checkbox"/> ematomi e flemmoni superficiali <input type="checkbox"/> ferite superficiali e profonde degli arti, trattate, 	<p>Somministrato in base a VALUTAZIONE MEDICA</p>	<p>Oxycontin RP 10 - 20 mg 1 cp / os x 2</p>	<p>≥ 4 ° giorno post operatorio se presente dolore VALUTAZIONE MEDICA</p>	<p>Per la prescrizione VEDERE CHIARIMENTI</p>
<p>intervento chirurgico day surgery - ambulatoriale</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> varicocele <input type="checkbox"/> ernia inguinale e parete addominale non complicata <input type="checkbox"/> idrocele <input type="checkbox"/> varici arti inferiori <input type="checkbox"/> cisti dermoide sacrale <input type="checkbox"/> onicectomia radicale <input type="checkbox"/> emorroidectomia <input type="checkbox"/> Biopsie linfonodali profonde <input type="checkbox"/> Biopsie muscolari e sottocutanee ampie <input type="checkbox"/> Fimosi <input type="checkbox"/> Incisione di ascessi e di fistole anali <input type="checkbox"/> Chirurgia minore della mammella 		<p>Perfalgan 1 flac ev in 15'</p> <p style="text-align: right;">oppure</p> <p>Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 100 in 30'</p> <p style="text-align: right;">oppure</p> <p>Contramal 1 fl / S. F. 100 in 30'</p>		

		<p style="text-align: right;">oppure</p> <div data-bbox="1077 116 1391 197" style="border: 1px solid black; background-color: #e0ffe0; padding: 2px;"><p>Kolibri, Patrol <u>1 cp / os x 2</u></p></div>	<p style="text-align: right;">oppure</p> <div data-bbox="1424 220 1738 301" style="border: 1px solid black; background-color: #e0ffe0; padding: 2px;"><p>Kolibri, Patrol <u>1 cp / os x 2</u></p></div>	
<p style="text-align: center;">Raccomandazione Per qualsiasi tipo di anestesia locoregionale la terapia antalgica va iniziata alla ripresa dell'attività motoria. SE IL DOLORE PERSISTE OLTRE LA TERZA GIORNATA POSTOPERATORIA, CONSULTARE IL MEDICO.</p>				

CHIARIMENTI

1. Il BOLO INIZIALE è somministrato in seguito a valutazione medica

Per la somministrazione della RESCUE DOSE ci si comporta come da schema seguente:



LIVELLO C		- dolore grave -			VAS 7 - 10
	Terapia antalgica			Rescue dose	
	bolo iniziale	1° - 3° / 4° giorno	giorni successivi		
malattia <input type="checkbox"/> colica renale	<p>Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 100 in 30'</p> <p>+ Buscopan 1 fl / S. F. 100 in 30'</p>	<p>Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 250 in 8 h</p> <p>oppure</p> <p>Buscopan 2 fl / S. F. 250 in 8 h</p> <p>+</p> <p>Idratazione in 24 h</p> <p>S.F. 750 ml S. Glucosata 5% 750 ml</p>	<p>Nexium 1 cp x 2</p>	<p>Morfina 10 mg 1f im</p>	
<input type="checkbox"/> Colica biliare	<p>Toradol o Lixidol 2 fl / S. F. 250 in 60'</p>	<p>Toradol o Lixidol 1 fl / S. F. 250 in 8 h x 3</p> <p>+</p> <p>Zofran 1fl / S. F. 250 in 3 h</p> <p>+</p> <p>Ranidil 2fl / S. F. 250 in 6 h</p> <p>+</p> <p>Digiuno per 6 h</p> <p>poi</p>		<p>RACCOMANDAZIONE</p> <p>NO MORFINA</p> <p>Perfalgan 1 flac ev in 15'</p>	

		Dieta liquida + Ghiaccio ipocondrio destro		
<input type="checkbox"/> idronefrosi acuta <input type="checkbox"/> coliche renali subentranti <input type="checkbox"/> coliche biliari resistenti <input type="checkbox"/> pancreatite acuta edematosa e grave <input type="checkbox"/> pancreatite acuta edematosa <input type="checkbox"/> peritonite diffusa o a focolaio <input type="checkbox"/> deiscenze e perforazioni con peritonite <input type="checkbox"/> addome acuto vascolare <input type="checkbox"/> sindrome emorroidaria acuta, ascesso perianale <input type="checkbox"/> sciatalgia, lombosciatalgia, lombaggine <input type="checkbox"/> fasciti e sindrome compartimentale <input type="checkbox"/> traumi contusivi addominali e toracici <input type="checkbox"/> dolore pelvico maschile e femminile <input type="checkbox"/> pazienti polifratturati <input type="checkbox"/> ustioni superficiali >10% s.c. <input type="checkbox"/> addome acuto, ferite addominali e toraciche, traumi chiusi addominali e toracici torsioni vascolari di organi (fase postdiagnosi e preoperatoria)	Morfina 1f <u>S. F. 100 in 30'</u> + Perfalgan <u>1 flac ev in 15'</u> oppure	Temgesic 3 fl in 240 ml S.F. in siringa elastomerica 24 / h (10 ml / h) oppure	Perfalgan <u>1 flac ev in 15' x 4</u> Tachipirina 1000 <u>1 cp / os x 4</u> + Contramal 50 mg 1cp / 20gtt x 4 oppure	Orudis <u>1 fl / S. F. 100 in 30'</u> <u>1 fl / im</u> <u>1 cp / os</u> oppure
	Temgesic <u>1 fl S. F. 100 in 30'</u> + Perfalgan <u>1 flac ev in 15'</u> oppure	Morfina 3 fl in 240 ml S.F. in siringa elastomerica 24 / h (10 ml / h) oppure	Contramal 1 fl / S. F. 100 in 30' x 4 <u>1 fl / im x 4</u> <u>20 gtt / os x 4</u> <u>1cp / os x 4</u> + Perfalgan <u>1 flac ev in 15' X4</u> oppure	Toradol o Lixidol <u>1 fl / S. F. 100 in 30'</u> <u>1 fl / im</u> <u>1 cp / os</u> oppure
	Temgesic 1f + Lixidol o Toradol 1 fl <u>in S. F. 100 in 30'</u> oppure		Contramal 1 fl / S. F. 100 in 30' x 4 <u>1 fl / im x 4</u> <u>20 gtt / os x 4</u> <u>1cp / os x 4</u> + Perfalgan <u>1 flac ev in 15' X4</u> oppure	Kolibri, Patrol <u>1 cp / os x 2</u> oppure
	Morfina 1f + Lixidol o Toradol 1 fl <u>in S. F. 100 in 30'</u> oppure		Oxycontin RP 10 mg <u>1 cp / os x 2</u> + Tachipirina 1000 <u>1 cp / os x 4</u> oppure	
intervento chirurgico <input type="checkbox"/> tutti gli interventi chirurgici videolaparoscopici <u>con</u> renaggio <input type="checkbox"/> tutti gli interventi chirurgici in laparotomia <u>con</u> drenaggio <input type="checkbox"/> mastectomia con linfadenectomia			Kolibri, Patrol <u>1 cp / os x 2</u> oppure	

NB: I nomi dei farmaci sono quelli che attualmente sono forniti dalla farmacia dell'ospedale.

INFILTRAZIONE POSTOPERATORIA della FERITA	<p>Infiltrare la ferita chirurgica, quando è possibile, secondo l'ampiezza della ferita chirurgica</p> <p>Ropivacaina 0.5 % - 1% (Naropina)[max 20 ml]</p> <p>Levobupivacaina 0.25 % -0.50%</p> <p>Lidocaina 1%-2% [max 20ml]</p>
--	---

RACCOMANDAZIONI

- Protocollo terapeutico da applicare in tutti i pazienti di età superiore a 16 anni;
- Gli oppioidi non vanno impiegati nei pazienti di età superiore a 75 anni e in condizioni cliniche compromesse salvo specifiche indicazioni.
- Nelle prescrizioni che prevedono l'uso di oppioidi va instaurata la terapia di prevenzione della nausea e del vomito con antiemetici (Desametasone 4 mg + Ondansetron 2 mg) ev in unico bolo.
- E' utile associare la terapia con gastroprotettori ed inibitori della pompa protonica quando indicato.